

## 彰化縣政府 函

地址：50001彰化市中山路2段416號  
承辦人：黃祈雯  
電話：047531688  
傳真：047274353  
電子信箱：jill15192002@email.chcg.gov.tw

受文者：彰化縣大村鄉公所

發文日期：中華民國108年6月3日  
發文字號：府農務字第1080184648號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：梅雨季節將屆香蕉黑星病好發期，請宣導蕉農務必做好防治工作，俾確保日後香蕉良好之品質及產量，請查照。

說明：

- 一、依據財團法人台灣香蕉研究所108年5月29日(108)台蕉研發字第 3330號函辦理。
- 二、中株期或已進入抽穗期蕉株，噴藥前宜先清園並割除下方嚴重受害之病葉，以減少感染源。進入終花期之果串，需先將果房適當整梳後，再行套袋。套袋後，需將套袋拉直，並避免套袋頂端因形成凹槽，造成雨水蓄集於套袋上方，引發套袋破裂及果房遭受黑星病菌感染之虞。
- 三、採用系統性藥劑配方於清晨進行防治。噴藥方式及藥劑配方如下列(可任選一種，並宜輪流施用，避免抗藥性之產生。請特別注意此類藥劑不可直接噴及果房。):

(一)使用肩背式微粒動力噴霧機：新植未抽穗蕉園使用24.9%待克利乳劑每公頃0.3公升，加水至30公升或23%亞托敏水懸劑，每公頃0.4公升，加水至30公升。

(二)使用配置落地式捲軸噴藥管之動力噴霧機



DE1080008646 無附件




車：藥劑種類同前，惟其二種系統性藥劑濃度調1,000~2,000倍。

(三)其他防治藥劑及施藥配方，請參考植物保護資訊系統  
([https://otserv 2 .tactri.gov. tw/ppm/](https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/))。

四、噴藥作業時，須做好安全措施，全程戴帽、戴口罩及穿長袖衣、長褲，避免皮膚接觸藥液，並將藥液儘量噴至葉片上方。

正本：本縣各鄉鎮市公所、彰化縣農會、本縣各鄉鎮市農會

副本：本府農業處



本案依分層負責規定授權主管科長決行

